

Calendario de la Huerta Fueguina

Especie	Forma y fecha de siembra	Distancia*	Asociación	Características de la cosecha
ACELGA	Almácigo: fines de septiembre a fines de oct. Directa: fines de octubre a 1ª quincena de febrero.	15 x 30 cm	Cebolla, repollo, lechuga, escarola, coliflor.	Hacer cortes laterales. La planta puede durar 2 años
AJO	Directa: 1era quincena de marzo a 2da quincena de abril.	10 x 20 cm	Lechuga, remolacha.	Al secarse las hojas arrancar las plantas con azada o pala.
APIO	Directa: 1era quincena de septiembre a 2da quincena de diciembre.	20 x 30 cm	Arveja, haba, lechuga, puerro, rabanito.	Cosechar antes de las heladas de otoño y sacar hojas laterales.
ARVEJA	Almácigo: 1era quincena de octubre.	5 x 40 cm	Zanahoria, ajo, repollo.	Cosecha escalonada, cuando las vainas están llenas.
CEBOLLA	Almácigo: 2da quincena de agosto a 2da quincena de septiembre	10 x 40 cm	Lechuga, remolacha, coliflor, repollo.	Cortes laterales y total de la planta.
ESCAROLA	Almácigo: 1era quincena de oct a fines de noviembre Directa: fines de noviembre a 1era quincena de enero	5 x 40 cm	Zanahoria, repollo, lechuga, remolacha.	Cortes laterales y total de la planta.
ESPINACA	Directa: 2da quincena de octubre y después del 21 de diciembre.	10 x 40 cm	Remolacha., repollo, coliflor, brócoli.	Cortes laterales y total de la planta.
HABA	Directa: 1era quincena de octubre a 1era quincena de diciembre.	30 x 70 cm	Zanahoria, ajo, repollo.	Cosechar antes de la maduración de las vainas, se puede dejar secar.
LECHUGA	Almácigo: 2da quincena de agosto. Directa: 1era quincena de octubre a 2da quincena de febrero.	20 x 20 cm	Acelga, remolacha, zanahoria, repollo, puerro, apio, cebolla.	Cultivo tupido, ralear. Cosechar las hojas laterales o toda la planta.
NABO	Directa: 1era quincena de octubre a 2da quincena de enero.	50 x 80 cm	Zanahoria, lechuga, arveja.	Cosechar antes de las heladas de otoño.
PAPA	Directa: 2da quincena de septiembre a 2da quincena de noviembre.	30 x 70 cm	Arveja, haba, coliflor, repollo, rabanito.	Cosechar cuando se secan las hojas, con azada o pala.
PEREJIL	Directa: 1era quincena de octubre a 2da quincena de noviembre. Al voleo cada 20 días.	1 x 10 cm	Zanahoria.	Se cosecha con cuchillo filoso a 1 cm. de la tierra y y rebrota.
PUERRO	Almácigo: 2da quincena de agosto hasta noviembre.	10 x 40 cm	Zanahoria, apio, lechuga.	Despuntar en caso de vicio. Se puede cosecha en invierno.
RABANITO	Directa: 2da quincena de octubre a 2da quincena de febrero. Se recomienda siembra escalonada.	15 x 40 cm	Arveja, zanahoria, espinaca, repollo, lechuga.	No deja mucho tiempo en tierra ya que se vuelven picantes.
REMOLACHA	Directa: 2da quincena de octubre a 1era quincena de febrero.	15 x 40 cm	Brócoli, ajo, coliflor, repollo, lechuga.	Cosechar antes de las heladas de otoño.
REPOLLITO DE BRUSELAS/ COLIFLOR	Almácigo: 2da quincena de septiembre a 2da quincena de diciembre.	40 x 40 cm	Zanahoria, puerro, cebolla, lechuga, remolacha	Se puede cosechar en invierno.
REPOLLO	Almácigo: 2da quincena de septiembre a 2da quincena de diciembre.	40 x 40 cm	Zanahoria, puerro, cebolla, lechuga, remolacha	Corte total. Se puede cosechar en invierno.
ZANAHORIA	Directa: 2da quincena de octubre a 2da quincena de noviembre.	10 x 25 cm	Arveja, puerro, cebolla, lechuga, espinaca.	Despuntar si se va en vicio aflojar la tierra antes de la cosecha.

* entre plantas e hileras